du XVIIIe siècle. Il en avait vu un autre exemplaire dans la collection de M. Wallace. Émile Moreau, de son côté, en signale un individu appartenant à l'espèce *Raja punctata* Risso, déposé au Musée Fleuriau de La Rochelle (*Poissons de France*, t. I, p. 206, 1881).

A quelle cause cette malformation est-elle attribuable? On est porté à y voir un arrêt de développement. Si l'on a égard à l'enchaînement sérial des Elasmobranches anhypoptères, conduisant des Aiguillats (*Acanthias*) aux Céphaloptères (*Cephaloptera*), nous y rencontrons les Anges (*Squatina*) présentant une tête entre deux pleuropes charnues libres et saillantes en avant, qui se rapprochent, comme aspect, des organes homologues des Raies. Ce n'est là qu'une présomption, laquelle demanderait à être confirmée par une étude du développement embryonnaire des *Raja*, jusqu'ici assez mal connu et présentant, comme toute recherche analogue sur les Elasmobranches ovipares, de très sérieuses difficultés. Yarrell (*loc. cit.*, p. 552) donne une figure où l'on voit une jeune Raie dans l'œuf et encore munie d'une vésicule ombilicale développée; le disque y offre déjà l'apparence qu'il présente chez l'adulte, mais les renseignements qui accompagnent ce document iconographique sont vagues et n'éclairent pas la question.

Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild, dans l'Afrique orientale.
Description d'une nouvelle espèce de Myriopodes du genre Pollyxenus,

par M. J. Chalande.

Pollyxenus aethiopicus nov. sp.

Corps ellipsoïde, rougeâtre, maculé de blanc en dessus, complètement blanc en dessous, ainsi que les pattes.

Tête grande, arrondie en avant.

Antennes courtes, de la longueur de la tête, coudées intérieurement entre le 5e et le 6e articles. Articles courts, sauf le 6e qui est deux fois plus grand que le 7e. Dernier article deux ou trois fois plus petit que le 7e et présentant à l'extrémité une couronne de 4 bâtonnets (fig. 1).

Yeux composés de 5 à 8 ocelles globuleuses, rougeâtres, agrégées sur les côtés de la tête, une centrale et les autres en cercle autour.

Pleures portant des gerbes de poils en forme d'épis irréguliers, atteignant en longueur le tiers ou la moitié de la longueur du corps.

Tergites portant deux rangées transversales de poils en épis de forme régulière et symétrique. Rangée antérieure située un peu en arrière du

milieu du tergite, incomplète et nulle dans la partie médiane; ses poils dirigés en avant et obliquement des côtés externes vers la ligne médiane. Rangée postérieure située près de la marge postérieure du tergite; ses poils dirigés parallèlement en arrière. Les poils des deux rangées sont de même longueur, ceux de la rangée antérieure parfois un peu plus longs et un peu courbes. les postérieurs droits. Les uns et les autres très larges.



Poils des faisceaux anals terminés en crosses simples et présentant sur un côté une série d'appendices rabattus (2 à 5), semblables à la crosse terminale (fig. 2 : extrémité d'un poil; fig. 3 : base d'un poil).

Pattes courtes, épaisses, à articles plus larges, que longs, sauf le 4ᵉ et le 8ᵉ (fig. 4). Dernier article des pattes portant vers son milieu, du côté interne, une épine très faible. Ongle trilobé.

Taille, deux millimètres.

Localité. — Éthiopie méridionale, près de la rivière Golba (3 août 1904). Récolté par M. Maurice de Rothschild. Cette espèce est une forme inter-

médiaire entre *P. lagurus* Latr. et *P. lucidus* Chal. Elle se rapproche de *P. lagurus* par la présence des ocelles, la forme des antennes et l'existence de deux rangées de poils sur les tergites; mais, chez *P. lagurus*, les poils de la rangée antérieure sont très courts et ceux de la rangée postérieure deux fois plus longs. Elle se rapproche de *P. lucidus* par les gerbes de poils des pleures et par la forme des poils des faisceaux anals. Les pattes sont de forme intermédiaire entre celles de *P. lagurus* et celles de *P. lucidus*. Chez le premier, le 4e article est toujours court.

Catalogue des Forficules des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris,

par M. Malcolm Burr.

(troisième partie et fin.)

---

22. Genre **Sparatta** Serville.

Sparatta nigrina Stäl. — Mexique (Lucas; collection Sallé, R. Oberthur, 1897); Guyane : territoire consté franco-brésilien, placers du Carsevenne et rivière Lunier (F. Geay, 1899).

— Schotti Dohrn.? — Guatemala (Angrand, 1855). Une seule femelle, étiquetée *Sparatta rufina* Stäl; je la range ici avec un peu d'hésitation, à cause d'une petite différence dans la forme du pygidium.

— W. signata Burr. — Mexique, ♂ (Lucas). *Types*.

23. Genre **Mecomera** Serville.

Mecomera brunnea Serville. — Santa Cruz de la Sierra (d'Orbigny, 1834). Un mâle, en très mauvais état.

— Weissi Burr. — Tonkin central : environs de Tuyen-Quan; vii-ix, 1 ♂ (A. Weiss, 1901). *Type*.

24. Genre **Chelisoches** Scudder.

Chelisoches superbus Dohrn. — Sumatra : côte orientale; Palembang, forêt du Nirou, ♂ (M. Bouchard, 1902).

— Doriæ Bormans. — Bornéo, ♀ (Allard, 1897).

— glaucopterus Bormans. — Tonkin : province de Tuyen-Quan, Haute Rivière Claire, ♂♀, printemps-été (A. Weiss, 1901); Tonkin central : région de Chim-Hoa et de Tuyen-Quan, ♂, été (A. Weiss, 1901).